

Avec nos 15000 prestataires dans le monde,  
nous sommes prêts à intervenir pour nos 45 millions de clients  
dans plus de 180 pays 24H/24, 365 jours par an


Notre métier, c'est l'assistance  
du quotidien à l'extrême



MUTUAIDE ASSISTANCE est aujourd'hui  
l'un des principaux acteurs de l'assistance en France

Pour plus d'informations, contactez-nous  
Tél : 01 45 16 63 35 - Fax : 01 45 16 63 91 - e-mail : service-commercial@mutuaide.fr  
Site internet http://www.mutuaide.fr

Le MemoPage  
ne se coupe pas,  
il se plie en 2 puis  
encore en 2.



MemoPage  
.com  
Modèle déposé  
Tous droits réservés  
ISSN 1762-5920

Santé :

## Calendrier des vaccinations

### 1<sup>er</sup> mois

- X **BCG** précoce pour les enfants en zones à risque.
- X **BCG** obligatoire pour l'entrée en crèche, en garderie.  
La vaccination est suivie d'un test tuberculique (cuti-réaction) 3 à 12 mois plus tard pour vérifier l'efficacité de la vaccination.
- X **Hépatite B** précoce (vaccination pratiquée dès la naissance) si la mère est porteuse de la maladie.

### 2<sup>e</sup> mois

- X **Tétracoq** : les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite sont pratiquées en même temps. - Première injection à 2 mois, - 2<sup>e</sup> injection à 3 mois, - 3<sup>e</sup> injection à 4 mois.  
On préfère le vaccin polio buvable au vaccin sous cutané dans les zones d'endémie (DTCoq-polio).
- X Vaccination contre *haemophilus influenzae B* (**grippe**)
- X **Hépatite B** (2 injections à 1 mois d'intervalle).

### 9 mois

- X Vaccination contre l'**hépatite A** parfois recommandée pour les enfants amenés à voyager en zones d'endémie.
- X Vaccination contre la **Rougeole** pour les enfants qui doivent aller en crèche ou en garderie. Dans ce cas, la vaccination contre les oreillons et la rubéole est pratiquée 6 mois plus tard.

**A noter** : une vaccination complète ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) est possible dès 9 mois en cas d'épidémie. Efficace si la

Editeur : MemoPage.com SA / 2014 / Auteur : F. Condat

X Vaccination contre *haemophilus influenzae B* (**grippe**) tous les ans, en automne.

### A partir de 60 ans

**A noter** : la vaccination contre l'hépatite B est recommandée si des personnes de l'entourage ont contracté la maladie et pour les voyages vers certaines destinations.

- X **Hépatite B** : vaccination recommandée pour les personnes des groupes à risque.
- X **Rubéole** : jeunes femmes non vaccinées auparavant, avec contraception efficace.
- X **Rappel DT-polio** tous les 10 ans.

### A partir de 18 ans

- X **Rappel DT-polio**
- X **Rubéole** : jeunes filles non vaccinées auparavant.
- X Test tuberculique (cuti-réaction) et **BCG** si le test est négatif.

### 16-18 ans

- X **ROR** : vaccination contre Rougeole-Oreillons-Rubéole, si non pratiquée plus tôt.
- X **Hépatite B** : vaccination recommandée si non pratiquée auparavant (2 injections à 1 mois d'intervalle et 3<sup>e</sup> injection 5 à 12 mois après la 2<sup>e</sup> injection).
- X Test tuberculique annuel (cuti-réaction) et **BCG** si le test est négatif.

### 11-13 ans

- X **Rappel BCG**
- X **ROR** : vaccination contre Rougeole-Oreillons-Rubéole, si non pratiquée plus tôt.
- X **Hépatite B** : rappel tous les 5 ans pour les sujets déjà vaccinés.

### 6 ans

- X **ROR** : 2<sup>e</sup> injection.
- X **BCG** obligatoire avant 6 ans (pour l'entrée en maternelle ou à l'école primaire).

### 3-6 ans

**A noter** : la vaccination contre *haemophilus influenzae* peut être pratiquée en même temps que la vaccination Tétracoq chez l'enfant de moins de 24 mois.

- X **Rappel Tétracoq/DTCoq-polio**
- X Vaccination contre *haemophilus influenzae B* (**grippe**).
- X **ROR** : vaccination contre Rougeole-Oreillons-Rubéole, si non pratiquée plus tôt.

### 16-18 mois

- X **ROR** : vaccination contre Rougeole, Oreillons, Rubéole.
- X **Hépatite B** : 3<sup>e</sup> injection (6 mois après la première / au maximum 12 mois après la 2<sup>e</sup> injection).
- X Vaccination contre l'**hépatite A** recommandée pour les enfants amenés à voyager en zones d'endémie.
- (2 injections à un mois d'intervalle, rappel 1 an après).

### 12 mois

vaccination est pratiquée dans les 3 jours suivant le contact avec un sujet infecté.

4

1

3

2